



DEL INVIERNO A LA PRIMAVERA. MEDIDAS A CONSIDERAR CON LOS CABALLOS



La transición del invierno a la primavera es un periodo crítico para el manejo equino debido al aumento de humedad y temperatura, lo que favorece la aparición de parásitos y el inicio de la actividad de insectos (moscas, mosquitos, tábanos).

Aquí tienes las medidas clave a adoptar, enfocadas en la higiene, protección y control de insectos:

1. CONTROL DE INSECTOS Y PARÁSITOS EXTERNOS

Con el aumento de temperatura, los insectos proliferan. Es vital proteger al caballo, especialmente si sufre de hipersensibilidad (dermatitis estival).

- Mantas y máscaras antimoscas: Utilizar mantas ligeras y transpirables, máscaras para ojos y orejeras para evitar picaduras en zonas sensibles como el cuello y la barriga.
- Repelentes: Aplicar repelentes en spray, gel o roll-on (con citronela, eucalipto o químicos) varias veces al día, ya que el sudor disminuye su eficacia.
- Limpieza de instalaciones: Retirar estiércol y materia orgánica 2-3 veces por semana para romper el ciclo de reproducción de las moscas.
- Gestión del agua: Eliminar agua estancada y revisar charcos, ya que son criaderos de mosquitos.
- Ventiladores: Colocar ventiladores en la cuadra para dificultar el vuelo de los insectos.




2. DESPARASITACIÓN INTERNA



- El cambio de estación es el momento ideal para la desparasitación, especialmente tras el deshielo, para eliminar parásitos que sobrevivieron al invierno.
- Antes de realizar la desparasitación se debe realizar un análisis coprológico (para saber la carga parasitaria) y si fuera necesario, tratar al animal.
- Para el tratamiento antiparasitario se debe cambiar asiduamente de medicamento para no crear resistencia.
- Evitar que el caballo coma en pastos contaminados los 3 días posteriores a la desparasitación.

3. CUIDADO DEL CABALLO Y TRANSICIÓN

- Cambio de manta: A medida que la temperatura sube, retirar mantas gruesas y pasar a mantas más ligeras o quitarlas durante el día, evitando que el caballo sude.
- Revisión de cascos: La primavera estimula el crecimiento del casco. Es esencial mantenerlos limpios y revisar si hay humedad o arestines (infección en la cuartilla por barro).
- Alimentación progresiva: Introducir el pasto primaveral poco a poco para evitar cólicos debido al alto contenido de azúcar en la hierba nueva.



4. ENTORNO

- Gestión de estiércol: Mantener el estiércol lejos de los establos y asegurar una buena ventilación.
- Limpieza de bebederos: Limpiar bebederos frecuentemente, eliminando larvas y agua estancada.

Se recomienda siempre consultar con un veterinario para establecer el calendario de desparasitación y protección más adecuado

